

# IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA

## BENZOATO DE BENZILA



**FORMA FARMACÊUTICA**  
Emulsão tópica - 250mg/ml.

**USO EXTERNO**

**APRESENTAÇÃO**  
Frasco de vidro com 100ml de emulsão.

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**COMPOSIÇÃO**

Cada ml contém:  
Benzoato de Benzila.....(DCB 01155).....250mg  
Excipiente q.s.p.....1ml  
(Excipientes: ácidoesteárico, trietanolamina e água deionizada).

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**Ação esperada do medicamento:**

- IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA é indicado para o tratamento da escabiose e pediculose, destruindo o ectoparasita causador da moléstia, sem prejudicar o hospedeiro.

**Cuidados de armazenamento:**

- Este produto deve ser guardado a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), ao abrigo da luz e umidade.

**Prazo de validade:**

- O prazo de validade, contado a partir da data de fabricação impressa na embalagem, é de 36 meses. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pode ser perigoso para a saúde.

**Gravidez e lactação:**

- IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA em gestantes, lactentes e crianças deve obedecer cuidados e observações rigorosas.

- Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

- Informe ao seu médico se está amamentando.

**Cuidados de administração:**

- Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Produto de uso exclusivamente tópico. Não deve ser ingerido devido à sua toxicidade.

**Interrupção do tratamento:**

- Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

**Reações adversas:**

- Têm sido relatadas reações de hipersensibilidade, como erupções cutâneas e outros tipos de reações alérgicas.

- Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

**“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”**

**Contra-indicações e precauções:**

- IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA é contra-indicado a pacientes sensíveis ao benzoato de benzila, na presença de: lesões da pele, feridas abertas, queimaduras, ou condições que possibilitem maior absorção do produto.

- IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA está indicado **somente para uso externo; não deve ser ingerido ou inalado. Evite o contato do produto com os olhos e mucosas.**

- Para auxílio ao tratamento, manter as unhas curtas e limpas, trocar e ferver as roupas de cama e o vestuário, diariamente.

- Informe ao seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis tais como: vertigens, náuseas, vômitos, diarreias, cefaléias e reações cutâneas.

- Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

**“NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.”**

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**FARMACODINÂMICA**

O benzoato de benzila, um escabicida e pediculicida, corresponde ao éster fenilmetílico do ácido benzóico. Seu mecanismo de ação provável, é a atuação no sistema nervoso do parasita, causando sua morte. É relativamente pouco tóxico, mas pode irritar a pele e os olhos. Não há provas de que ele seja absorvido através da pele em quantidades suficientes para causar toxicidade sistêmica.

**FARMACOCINÉTICA**

Quando absorvido, sofre hidrólise rápida, originando ácido benzóico e álcool benzílico, e este, por oxidação posterior, transforma-se também em ácido benzóico, que é conjugado com a glicina para a síntese do ácido hipúrico. A excreção é renal, como ácido hipúrico.

**INDICAÇÕES PRINCIPAIS**

IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA é apresentado na forma de emulsão e é indicado no tratamento da escabiose (infestações por *Sarcoptes scabiei* ou sarna) e da pediculose (infestações por *Pediculus capitis* ou piolho e *Phthirus pubis* ou chatô).

**CONTRA-INDICAÇÕES**

IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA é contra-indicado a pacientes com hipersensibilidade ao fármaco ou a qualquer outro componente da fórmula. Na presença

de lesões na pele, feridas abertas, queimaduras, ou condições que possibilitem maior absorção do produto. Este produto é contra-indicado em caso de gravidez.

**PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA está indicado **somente para uso externo; não deve ser ingerido ou inalado.**

Deve-se evitar contato com os olhos; mucosas e meato uretral assim como, evitar amamentar durante o tratamento.

Os familiares de mesmo convívio devem ser tratados a fim de se evitar a infestação.

As regras de higiene devem ser mantidas, tais como: manter as unhas curtas e limpas, trocar e ferver as roupas de cama e o vestuário diariamente, a fim de evitar a reinfestação.

Não usar durante a gravidez, a menos que seja prescrito.

O risco/benefício deve ser avaliado em inflamações epidérmicas agudas, escoriações abertas ou feridas com exsudato.

Deve-se evitar o uso de IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA em crianças desnutridas.

**REAÇÕES ADVERSAS**

Pode ocorrer irritação local e ocular, sensação de ardor, comichão. Embora raro, é possível ocorrer reações de hipersensibilidade ou absorção maior que o comum, causando: vertigem, cefaléia, náuseas, vômito, diarreia, retenção urinária, convulsões, dispnéia, cianose, colapso circulatório e reações cutâneas. Cefaléia, distúrbios gastrintestinais e respiratórios podem ocorrer se ingerido.

**ALTERAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS**

Não foram, até o momento, descritas alterações significativas em exames laboratoriais.

**Sinais de intoxicação:** convulsão ou excitação central, retenção urinária.

**POSOLOGIA E MODO DE USAR**

ATENÇÃO: IQUEGO - BENZOATO DE BENZILA para tratamento da pediculose deve ser utilizado diluindo-se uma parte do produto em uma parte de água, conforme indicado abaixo:

Adultos e crianças:

Escabiose:

• Após lavagem com água e sabão por cerca de 10 minutos, aplica-se a loção no corpo, abaixo da região do pescoço, deixando secar e permanecer durante a noite. Esse procedimento deve ser repetido por 3 noites seguidas ou em noites alternadas, totalizando 3 aplicações.

• A roupa de cama e vestuário pessoal devem ser trocados e fervidos diariamente.

Pediculose:

• Diluir uma parte do produto em igual volume de água (adultos e idosos) ou três volumes de água (crianças). Aplicar a loção na área afetada e deixar permanecer por 24 horas. Se necessário, a aplicação deve ser repetida após 5 dias, no máximo por mais 2 vezes.

• A roupa de cama e vestuário pessoal devem ser trocados e fervidos diariamente.

**SUPERDOSAGEM**

No caso de ingestão acidental, o tratamento é, principalmente, de suporte. Deve-se induzir ao vômito nos indivíduos conscientes e realizar lavagem gástrica, nos inconscientes. No caso de superdosagem, os sintomas mais comuns são: excitação central, dermatite de contato e retenção urinária. Nestes casos, procurar orientação médica.

Cefaléia, distúrbios gastrintestinais e respiratórios podem ocorrer se ingerido.

**Sinais de intoxicação:** convulsão ou excitação central, retenção urinária.

**“ATENÇÃO: EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA, O MÉDICO RESPONSÁVEL DEVE SER NOTIFICADO.”**

**CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30 °C) E AO ABRIGO DA LUZ E UMIDADE.**

**USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO.**

Registro no MS - 1.0884.0364.0015 - Frasco de vidro com 100ml.  
Farmacêutico Responsável: Dr.ª Maria Aparecida Rodrigues - CRF-GO Nº 1328  
Nº de lote - Data de Fabricação - Prazo de Validade: vide frasco

**ESTADO DE GOIÁS - SECRETARIA DA SAÚDE**

**IQUEGO - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A.**

Av. Anhanguera, 9.827 - Bairro Ipiranga - GOIÂNIA - GOIÁS

CX Postal: 15.102 - CEP: 74.450-010

CNPJ Nº 01.541.283/0001-41 - Indústria Brasileira



IQ.110117093/00